

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
СКІН-КАП
(SKIN-CAP)

Загальна характеристика:

основні фізико-хімічні властивості: маслянистий, жовтуватий розчин з білими частинками, з характерним запахом;

склад: 100 мл розчину містять: цинку піритіону - 0,2 г;

допоміжні речовини: натрію лаурилсульфат, ізопропілмірістат, спирт етиловий, сорбітол 70%, твін-80, ізобутан, пропан, бутан.

Форма випуску. Аерозоль.

Фармакотерапевтична група. Дерматологічні засоби. Препарати з пом'якшувальною та захисною дією. Код АТС Д 02AB

Фармакологічні властивості. Препарат виявляє антисептичну, в'язучу та протизапальну дію: пригнічує проліферацію епітеліальних клітин шкіри.

Фармакокінетика. При зовнішньому застосуванні цинк піритіон накопичується в місцях ураження шкіри. Системна абсорбція відбувається дуже повільно, тому препарат виявляється у крові у слідових кількостях.

Показання для застосування. Скін-Кап аерозоль застосовують для лікування дорослих та дітей, старших 3 років, як зовнішній засіб. Призначають при лікуванні різних форм псоріазу, дерматитів (у тому числі атопічного та нейродерміту), екземи, запальних реакцій шкіри, шкірного свербіжу, підвищеного лущення шкіри, себореї волосистої частини голови, а також різнокольорового лишая.

Спосіб застосування та дози. Препарат розпилюють на всі уражені ділянки шкіри, тримаючи на відстані близько 15 см від поверхні шкіри. Уражені ділянки оброблюють 2-3 рази на день до досягнення клінічного ефекту. Для досягнення стійкого ефекту, застосування препарату рекомендується продовжити протягом одного тижня після зникнення симптомів.

Перед застосуванням флакон струснути декілька разів. Під час розпилення флакон потрібно тримати у вертикальному положенні.

Для обробки лікарським препаратом волосистої частини голови застосовується спеціальна насадка.

Побічна дія. У поодиноких випадках можливі алергічні реакції (почервоніння шкіри, свербіж, шкірний висип).

Протипоказання. Еритродермія. Підвищена чутливість до компонентів препарату. Дитячий вік до 3 років.

Передозування. Симптоми передозування не виявлені.

Особливості застосування. Можливе застосування препарату за абсолютним показанням у період вагітності та лактації. При експериментальному дослідженні не виявлена ембріотоксична та тератогенна дії препарату. Препарат застосовують при поверхневих неінфікованих ураженнях шкіри.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Скін-Кап аерозоль не рекомендується

застосовувати одночасно з мазями або кремами, що містять глюкокортикостероїди.

Умови та термін зберігання. Зберігати в сухому, захищеному від дії світла місці, при температурі від 4 – 50 °С, у недоступному для дітей місці. Термін зберігання - 5 років.